



ROBENACOXIB (ONSIOR)

藥物說明

Robenacoxib 是一種選擇性 COX-2 非類固醇消炎止痛藥 (NSAID)，主要用於緩解疼痛與炎症，特別適用於術後疼痛控制以及骨關節炎等肌肉骨骼疾病的管理。

適用對象

- 狗與貓，年齡需滿4個月以上，體重需超過2.5公斤。
- 用於術後疼痛管理的連續使用天數：
 - 狗：最多3天
 - 貓：最多6天 (根據不同國家標準).

服用方法

- 口服或皮下注射，遵循醫師指示劑量：
 - 狗：1-2 mg/kg 每日一次.
 - 貓：1-2.4 mg/kg 每日一次
- 給藥時間：可空腹服用，但若腸胃敏感，建議隨餐服用以減少嘔吐或腹瀉的風險。
- 注意事項：
 - 若錯過一劑，請勿加倍補充，應按正常時間服藥。

可能副作用

1. 常見副作用
 - 嘔吐、腹瀉、軟便：通常停藥後會自行改善。
 - 解決方法：隨餐服藥可降低腸胃不適的風險。
2. 嚴重副作用 (少見但需注意)
 - 胃潰瘍：症狀包括食慾不振、吐血或便血。
 - 腎功能異常：發生在脫水或腎功能邊緣的動物。
 - 肝功能問題：可能出現眼睛或牙齦黃染、持續嘔吐或腹瀉。
3. 📞 若發現上述嚴重副作用，請立即聯絡您的獸醫師。

注意事項與禁忌

1. 避免同時使用其他 NSAIDs 或類固醇藥物，例如 Prednisone，以免增加副作用風險。
2. 腎臟、肝臟或胃腸道疾病患者需慎用，如必要需密切監控。
3. 禁用於懷孕或哺乳動物，因 COX-2 對生殖功能重要，安全性尚未建立。
4. 需定期血液檢查：
 - 長期使用者：建議開始治療前及治療兩週後進行血液與腎肝功能檢查。

藥物交互作用

- 避免與利尿劑、ACE抑制劑、抗真菌藥 (如 Fluconazole) 或其他高蛋白結合藥物同時使用。
- 若同時使用抗凝血劑或甲氨蝶呤 (Methotrexate)，請告知您的獸醫師。

保存方式

- 口服藥：存放於室溫 (低於25°C)，避免光線直射，不可冷藏。
- 注射液：冷藏於2°C 至 8°C之間，首次使用後應在12週內使用完畢。

長期使用的考量

1. 安全性問題
 - 長期使用 NSAIDs (包括 Robenacoxib) 可能增加胃腸道潰瘍、腎臟損傷 和 肝功能異常 的風險。
 - COX-2 選擇性抑制劑雖減少了部分副作用，但不代表完全不會發生。
2. 監控需求
 - 進行血液檢查 (腎、肝功能指標) 和臨床監測：
 - 治療開始前：確認肝腎功能正常。
 - 使用2週後：再次評估肝腎功能。
 - 長期使用者：每2-3個月進行檢查。
3. 替代方案
 - 在慢性疼痛 (如骨關節炎) 管理中，獸醫師可能會搭配其他療法，以降低長期 NSAID 使用的風險，例如：
 - 輔助療法：軟骨保護劑 (如 PSGAGs)、Omega-3 脂肪酸、氨基葡萄糖等。
 - 藥物：Amantadine、Gabapentin 等非 NSAID 類止痛藥。
 - 物理治療：如雷射療法、復健治療。

Robenacoxib (Onsior) 是一種安全且有效的短期止痛藥，據目前的臨床指引，主要適用於短期使用，特別是在術後疼痛管理上，狗和貓的建議使用天數分別為最多3天和6天。然而，實務上，部分獸醫師會在特定情況下 (如慢性疼痛管理) 依照個案需求進行較長時間的使用，但需進行謹慎評估與嚴格監控。

若您有進一步疑問或特定個案需求，請隨時與您的獸醫師聯繫！