



利尿劑 Furosemide 用藥資訊

簡介

Furosemide為一種常見的第一線利尿劑，常用於犬貓和其他哺乳類動物。此藥物主要作用於腎臟－腎小管的電解質通道，藉此來調節體內的水分平衡。主要使用時機為左心或右心衰竭（治療鬱血性心衰竭）而引起的體液過負荷（體內水分太多，身體不能夠承受了）。使用Furosemide時，應確保毛孩有充足飲水，因為毛孩會感到口渴並頻繁排尿，家長須根據不同的排尿行為改變做出相對應的生活調整。

劑型與給藥方式

Furosemide有多種形式，包括口服劑型和注射劑型：

口服劑型：原始狀態為片狀藥物，將會依據劑量調劑成膠囊或粉末等形式。

注射劑型：通常在獸醫院由專業人員操作，路徑有靜脈注射、肌肉注射與皮下注射；方式有單次給予、定期給予、連續注射等等。

劑量與監控

起始治療前，為了讓醫師了解毛孩用藥前的身體狀況，用以評估是否能使用該藥物，須進行血液學檢查和尿液學分析。必須要定期回診，且定期監控血液檢查和尿液檢查，並配合毛孩生理狀態和檢查結果來調整劑量。如未調整劑量但毛孩的尿量或飲水量卻有明顯變化，除了注意環境因子是否有改變外，也應立即聯絡醫院並提前回診。如果需要調整藥物使用劑量，必須遵照獸醫指示，家長不應自行調整。

副作用與預防措施

常見副作用包括增加飲水量和尿量增加，並可能導致電解質失衡。對於炎熱的環境耐受度下降，應盡量避免毛孩曝曬在陽光下，並維持舒適的環境（溫度與溼度得宜）。

存儲與安全

應將Furosemide存放在密封、避光、兒童無法接觸的環境中，保持在25°C以下的室溫，避免陽光直射並遠離熱源或直射日光。

藥物交互作用

Furosemide可與ACE抑制劑、氨基糖苷類抗生素、非類固醇類消炎藥等發生交互作用，新增任何藥物前應與獸醫師諮詢。

這份衛教資訊旨在提供基本的藥物使用指導，
並不能替代專業的獸醫建議。
如有任何疑問或擔憂，請諮詢您的獸醫師。