



# 可樂寧 Clonidine 犬隻用藥資訊

## 簡介

可樂寧 (Clonidine) 是一種  $\alpha$ -腎上腺素受體致效劑，具有多種藥理作用，常用於治療犬隻的行為問題，例如分離焦慮症、噪音恐懼症（如雷聲恐懼）以及去獸醫院時的恐懼反應。本衛教文僅涵蓋部分關於可樂寧的用途，詳細的適應症請諮詢您的獸醫師。（\*備註）

## 用途

- 短期應對焦慮與恐懼反應：可樂寧常用於特定情境下的應急治療，例如去獸醫院前使用，幫助減少犬隻的恐懼和焦慮反應。起效時間快，且只持續 3-4 小時，很適合策略性給藥。
- 長期行為調整：可樂寧也可以作為長期行為調整的輔助藥物，幫助犬隻逐漸適應壓力來源。不過，完整的療效可能需要 1-2 週才能顯現。
- 輔助治療：可樂寧通常與其他藥物（如三環抗抑鬱劑或 SSRIs）合併使用，以達到更佳的效果。

## 劑量與監控

一開始建議從最低劑量開始使用，並根據犬隻的體重和反應逐步調整劑量。

## 注意事項

1. 副作用：可樂寧可能會導致短暫的鎮靜、心跳減慢、口乾等副作用，部分狗可能會因口乾而增加飲水量。
2. 禁忌症：由於可樂寧會影響血糖波動，不建議用於糖尿病動物。
3. 藥物交互作用：可樂寧與其他降血壓藥物（如  $\beta$  受體阻斷劑）一起使用時，需特別注意，可能會導致過度的心跳減慢和低血壓。此外，與麻醉藥、鎮靜藥聯合使用時，需留意其加乘效果。
4. 逐漸停藥：長期使用後停止可樂寧時，應逐步減少劑量以避免出現高血壓等副作用。
5. 心血管注意事項：對於患有心血管疾病的動物，使用可樂寧時應謹慎，但心血管疾病並非使用此藥物的禁忌狀況。
6. 拮抗劑的使用：在某些情況下，如果發生不良反應或誤食過量藥物，可以使用  $\alpha$ 2-拮抗劑來逆轉可樂寧的作用。

## 附加提醒

- 使用時間：可樂寧應於所需情境發生前約 2小時給藥。
- 多次給藥：如果藥效在 4-6 小時後消退，可根據需要再次給藥。
- 行為與環境管理：除了藥物治療，環境管理與行為調整（如正向強化訓練）也是關鍵。可樂寧的使用應與其他治療方式結合，以達到更好的效果。

這份衛教資訊旨在提供基本的藥物使用指導，  
並不能替代專業的獸醫建議。  
如有任何疑問或擔憂，請諮詢您的獸醫師。

\*備註：目前，沒有足夠的資訊支持可樂寧用於貓咪，  
因此不建議將此藥物使用於貓